

кормовая добавка

MAXISORB®

адсорбент
МИКОТОКСИНОВ



«МАКСИСОРБ®» – Многокомпонентный адсорбент микотоксинов с инновационной формулой, предназначенный для адсорбции микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает гепатопротекторными свойствами;
- Препятствует всасыванию эндо-, микотоксинов и нивелирует технологические стрессы;
- Снижает токсикологическую нагрузку на организм животного;
- Снижает вероятность ложноположительного результата теста молока на содержание антибиотиков;
- Уменьшает количество соматических клеток в молоке жвачных животных;
- Увеличивает продуктивность животных и позволяет получить молоко высокого качества;
- Снижает затраты на лечение и профилактические мероприятия;
- Улучшает (повышает) качество и снижает себестоимость получаемой продукции.

СОСТАВ

Диоктаэдрический монтмориллонит (бентонит очищенный) – обладает способностью к набуханию благодаря своему строению и имеет ярко выраженные сорбционные свойства. Адсорбирует бактерии, вирусы, токсины, повышает сопротивляемость слизистой кишечника к агрессивным факторам и способствует укреплению иммунитета.

Клеточные стенки дрожжей (*Saccharomyces cerevisiae*) – благодаря пористому строению образует биологическое "сито", которое адсорбирует, как эндотоксины, так и микотоксины. Способны к адсорбции полярных и неполярных микотоксинов, оказывают иммуномодулирующее действие, способствуют поддержанию иммунитета и развитию микрофлоры кишечника.

Цеолит (сокернит) – обладает избирательной адсорбцией и способностью к ионному обмену. Способствует поглощению газов и других токсических соединений, выводит из организма вредные продукты метаболизма и патогенные вещества.

Бетаин – улучшает конверсию корма, участвует в росте мышечной ткани, функционировании клеток иммунитета, улучшает работу печени, а также поддерживает водно-солевое равновесие в клетке, помогает преодолеть «осмотический стресс».

Диоксид кремния (высокодисперсный кремнезем) – наноструктурный природный минерал, обладает мощным адсорбирующим и детоксицирующим свойством, адсорбирует полярные и неполярные микотоксины (трихотецены, зеараленон и охратоксины), поступающие или образующиеся в процессе метаболизма в организме животных, в том числе птиц и рыб, а также улучшает сыпучесть продукта.

Комплекс флаволигнанов (флавоноидов) расторопши пятнистой – оказывает гепатопротекторное, желчегонное, а также антиоксидантное, детоксицирующее и лактогонное действие. Особую ценность представляет вещество силимарин – единственное известное на сегодняшний день природное соединение, защищающее клетки печени и восстанавливающее ее функции. Силимарин укрепляет клеточные мембраны печени, препятствуя проникновению в печень ядовитых веществ, ускоряет регенерацию поврежденных гепатоцитов, а также способствует образованию новых клеток.

Янтарная кислота – естественный природный метаболит, восполняющий энергетические нужды организма. Оказывает антистрессовое и антиоксидантное действие, нормализует энергетический и углеводный обмен и общее физиологическое состояние.

Пребиотики МОС – устойчивы к воздействию пищеварительных ферментов, что позволяет им не перевариваться в тонком отделе кишечника и сохранять биологическую активность в толстом кишечнике, связывая рецепторы условно-патогенных бактерий, тем самым предупреждая их колонизацию в желудочно-кишечном тракте. МОС стимулируют неспецифическую иммунную систему, активируя макрофаги и производство иммуноглобулинов в периоды стресса, при инфекциях, смене кормов, транспортировке, вакцинации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Адсорбент вводят в корма на комбикормовых заводах и/или в кормосмеси в кормоцехах хозяйства, используя существующие технологии смешивания **0,5-2,5 кг** на 1 тонну комбикорма в зависимости от степени поражения корма микотоксинами.

С профилактической целью применять в дозировке **0,5 кг/тн.** Осложнений и побочных явлений при применении не установлено.

Норма ввода для КРС:

При высоком уровне зараженности кормов микотоксинами: **30-60 г/гол/сут.**

Для профилактики микотоксикозов или при низком уровне зараженности кормов: **20-30 г/гол/сут.**

Ограничений по использованию продукции после применения кормовой добавки нет.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок для ввода в полнорационные комбикорма.

Фасовка в ведра по 20 кг или бумажные мешки по 25 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом месте. Избегать попадания влаги.

СРОК ГОДНОСТИ

При соблюдении условий хранения – 2 года.

Изготовлено по ТУ 10.91.10-007-62699387-2016.

Регистрационный № ПВР-2-7.17/03369.

Регистрационный номер ДС РОСС RU Д-РУ.РА01.В.08624/22.

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО «БИОРОСТ»,

Краснодарское обособленное подразделение, 353231, РФ,

Краснодарский край, Северский район, пгт Ильский, промзона.

Юридический адрес: ООО «БИОРОСТ», 125375, г. Москва,

вн.тер.г. муниципальный округ Тверской,

ул. Тверская, д. 12, стр. 1, офис 28.

Жми на кнопку

Сделать заказ



Инструкция
по применению

Сорбционная емкость*

Вид микотоксина	Сорбционная эффективность, %
Афлатоксин В1	не менее 95
Охратоксин А	не менее 90
Т-2-токсин	не менее 60
Зеараленон	не менее 70
Фумонизин	не менее 70
Дезоксиниваленол	не менее 65

* по данным отчёта о лабораторных испытаниях 2016, 2018 гг.

Тел. 8 800 707 52 30, Коммерческая служба: доб. 1815;

E-mail: Info@biorost.su

www.biorost.su