

Афлуксид®

для телят и поросят

Кормовая добавка природного происхождения с антидиарейным действием



«Афлуксид®» - кормовая добавка для нормализации пищеварения у молодняка сельскохозяйственных животных, применяется для борьбы с диареей, а также в составе комплексной терапии при лечении диспепсии в период стресса и при смене рационов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает адсорбирующим действием;
- Образует поливалентные связи с гликопротеинами слизи;
- Стабилизирует защитный слизистый барьер желудочно-кишечного тракта;
- Уменьшает потерю электролитов и жидкости;
- Не вызывает нарушений деятельности нормальной микрофлоры кишечника;
- Способствуют незначительному повышению уровня pH и уменьшению агрессивного воздействия соляной кислоты.



СОСТАВ

Смектит (монтмориллонит) - обладает способностью к набуханию благодаря своему строению и имеет ярко выраженные сорбционные свойства. Адсорбирует бактерии, вирусы, токсины, повышает сопротивляемость слизистой кишечника к агрессивным факторам и способствует укреплению иммунитета.

Глюкоза - оказывает дезинтоксикационное, метаболическое действие, обеспечивает клетки организма необходимой энергией, что особенно важно при обезвоживании.

Комплекс солей (цитрат натрия, хлорид натрия, хлорид калия) - электролиты, нормализуют водно-электролитный обмен в организме животных.

Сахарин натрия - благодаря своим вкусовым свойствам, облегчает скармливание (выпойку) животному.

Ванилин - натуральный ароматизатор, облегчает процесс скармливания (выпойки) животным в период стрессов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Коровам при диарее смешивать **80-100 г** на одну голову, **2 раза в день** в течение **3-4 дней**, предварительно развести в 300-500 мл теплой воды, выпить принудительно.

Телятам при первых признаках диареи, а также в целях ее предупреждения (при переводе с молозива на ЗЦМ), смешивать **30-50 г** Афлуксид на одну голову **1-2 раза в день**, с водой, молоком, ЗЦМ в течение **3-4 дней**. При продолжительной и сильной диарее, развести **50 г** порошка (две мерные ложки) в **200-300 мл** теплой кипяченой воды и выпить принудительно перед скармливанием молока (ЗЦМ). В дальнейшем использовать порошок при выпойке вместе с молоком (ЗЦМ) по **50 г** на голову (две мерные ложки) **2 раза в день** в течение **3-4 дней**.

Пороссятам добавка скармливается всему гнезду, исходя из расчета **10-15 г** на голову за одно скармливание. Порошок может смешиваться с полужидкими и жидкими кормами. Применять рекомендуется **2 раза в сутки**, в течение **3-4 дней**. С профилактической целью скармливать добавку рекомендуется **1 раз в день** в течение **3-4 дней** из расчета **10-15 г** на голову.

Ягнятам, жеребят и др. Афлуксид применяется исходя из расчета в среднем **1 г** препарата на **1 кг веса** животного в сутки. Для усиления и закрепления положительного эффекта, рекомендует использовать добавку в составе комплексной терапии, а после основного лечения, в течение **3-х** последующих дней вводить в рацион в дозировке **30 %** от лечебной.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок для приготовления суспензии.

Фасовка в ведра по 2,5 кг.

Мерная ложка на 25 мл в комплекте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом месте. Избегать попадания влаги.

СРОК ГОДНОСТИ

При соблюдении условий хранения - 2 года.

Изготовлено по ТУ 2164-002-62699387-2013

Регистрационный № ПВР-2-2.15/03125.

Регистрационный номер ДС РОСС RU Д-RU.PA01.B.068208/21.

ПРОИЗВЕДЕНО:

ООО «БИОРОСТ», Краснодарское обособленное подразделение, 353231, РФ, Краснодарский край, Северский район, пгт Ильский, промзона.

Юридический адрес: ООО «БИОРОСТ», 125375, г. Москва,

вн.тер.г. муниципальный округ Тверской,

ул. Тверская, д. 12, стр. 1, офис 28.

тел. 8 800 707 52 30, Коммерческая служба: доб. 1815

E-mail: info@biorost.su

www.biorost.su

Вид животного	Возрастная группа, дни	Дозировка на 1 голову, г		Скармливание добавки
		Профилактическая	Лечебная	
Поросята	7-45	3,0	10,0	1-2 раза в сутки
	46-120	3,0	15,0	1-2 раза в сутки
Телята	1-90	15,0	50,0	1-2 раза в сутки
Овцы/Козы		1,5	5,0	1-2 раза в сутки
Лошади		15,0	50,0	1-2 раза в сутки



= ок. **30 г.** Афлуксид

Жми на кнопку

Сделать заказ



Инструкция по применению

